

JORDBRUKARDAGAR 2018

RÅTTSVINGEL –latin VULPIA MYUROS

EKORRSVINGEL- latin VULPIA BROMIDES

SFO/SVENSK RAPS

TORE DALHQUIST




































Væselhale i 2008 på Flakkebjerg (JB6)
Observeret første gang i 2006. Forsøget startet i 2003



Kilde: Bo Melander, AU Flakkebjerg

Bekämpning av Råttsvingel/Ekorrsvingel (Vulpia)

Förebyggande åtgärder

- Varierad växtföljd-mer vårsådd
- Så inte höstsäd för tidigt
- Plöj åtminstone ibland
- Endast halmharving i stubb
- Etablera höstsäd noggrant
- Förhindra spridning av frön

Kemisk bekämpning i höstsäd

- 2-3 l Boxer + 0,1 l Diflanil/Legacy vid uppkomst
- Vid behov följ upp 0,6-0,75 l Atlantis + superolja

Kemisk bekämpning i höstraps

- 0,75-1,25 l Kerb



Gräsogräs (fler förebyggande åtgärder)

- Eegna maskiner/maskinsamverkan/maskinstation
- Utsädesenheten markerar förekomst vid fältbesiktning
 - gäller råttsvingel/ekorrsvingel o renkavle (flyghavre alltid varit obligatoriskt)
- Vid förekomst i frövallen
 - Plockning
 - Avputsning
 - Avstrykning
 - Drösning
 - Tröskning
- Toppmodern rensutrustning kan klara mycket, men inte allt ...



GRUNDUTSÄDE (ODLINGSUTSÄDE)

NOLLTOLERANS FÖR

- RENKAVLE
- RÅTTSVINGEL/EKORRSVINGEL
- SKRÄPPA (Rumex)
- FRÖFÖRETAGEN HAR ETT STORT ANSVAR



VAD GÖR VI FRAMÖVER?

- Ett intensifierat lagarbete krävs NU i alla led
- Förebyggande arbete MINDRE KOSTSAMT än bekämpning/sanering i framtiden
- Behovet av INFORMATION är stort för oss ALLA kring de "svåra gräsogräsen"-koppla bort prestigen
- Kolla "HÄLSOLÄGET " på egendomen –vad finns på mina fält?

